



## Morbilidad

Fecha elaboración: Abril-Mayo de 2018

### Diez primeros diagnósticos en Consulta Externa por sexo y grupos de edad (298 causas CIE10), Medellín, año 2016

Hombres			Mujeres			Total		
Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%
Todas las edades			Todas las edades			Todas las edades		
Hipertensión esencial	202.856	8,6	Hipertensión esencial	389.889	10,2	Hipertensión esencial	592.745	9,6
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	157.444	6,7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	275.313	7,2	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	432.757	7,0
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	133.403	5,7	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	173.365	4,5	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	306.768	5,0
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	100.125	4,3	Diabetes mellitus	128.688	3,4	Diabetes mellitus	208.311	3,4
Diabetes mellitus	79.623	3,4	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	122.143	3,2	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	200.760	3,3
Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	78.617	3,3	Otras dorsopatías	114.822	3,0	Otras dorsopatías	186.095	3,0
Otras dorsopatías	71.273	3,0	Trastornos de los tejidos blandos	110.078	2,9	Trastornos de los tejidos blandos	171.019	2,8
Caries dental	69.748	3,0	Dolor abdominal y pélvico	110.003	2,9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	169.440	2,8
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	61.132	2,6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	96.762	2,5	Caries dental	159.486	2,6
Trastornos de los tejidos blandos	60.941	2,6	Caries dental	89.738	2,4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	157.894	2,6
Otras causas	1.331.838	56,7	Otras causas	2.199.520	57,7	Otras causas	3.572.046	58,0
<b>Total todas las edades</b>	<b>2.347.000</b>	<b>100</b>	<b>Total todas las edades</b>	<b>3.810.321</b>	<b>100</b>	<b>Total todas las edades</b>	<b>6.157.321</b>	<b>100</b>

En el año 2016 en Medellín, las diez primeras causas de consulta externa agruparon el 43,3% de las atenciones en hombres de todas las edades y 42,3% en mujeres.

El primer motivo de consulta externa fue la Hipertensión esencial, principalmente en las personas de 45 años o más. Esta proporción de atenciones resultó ser mayor en mujeres (10,2%) que en hombres (8,6%) y agrupa el 9,6% de las atenciones en este servicio.

El segundo motivo de consulta denominado "Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte" según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10, incluye las afecciones menos definidas y los síntomas que hacen sospechar, con la misma verosimilitud, dos o más enfermedades o varios sistemas del cuerpo humano y sin que el caso haya sido estudiado en forma suficiente para llegar a establecer un diagnóstico final. <sup>(1)</sup>

En tercer lugar se agrupan dos diagnósticos relacionados con salud bucal: "Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten" y la "Caries Dental", que en conjunto suman el 7,6% de las atenciones, la proporción fue mayor en hombres (8,7%) que en mujeres (6,9%).

Específicamente en los hombres, se presenta el diagnóstico relacionado con "Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo", con un (4,3%).

Seguidamente, algunos diagnósticos que se presentan dentro de los primeros motivos de consulta, son de igual o muy similar proporción en hombres y mujeres, estos corresponden a: "Diabetes mellitus" (3,4%), "Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores" (3,3%), "Otras dorsopatías" (3,0%), "Otras enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (2,6%) y "Trastornos de los tejidos blandos".

Específicamente en las mujeres, se presenta dentro de los primeros motivos el "Dolor abdominal y pélvico" con un 2,9%.

#### Fuente:

RIPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios; morbilidad por consulta externa. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2016.

(1) Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Décima Revisión. Volumen 1. Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99).



## Morbilidad

### Diez primeros diagnósticos en Consulta Externa por sexo y grupos de edad (298 causas CIE10), Medellín, año 2016

Hombres			Mujeres			Total		
Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%
Menores de 1 año			Menores de 1 año			Menores de 1 año		
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	7.824	13,0	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8.065	15,3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15.889	14,0
Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	7.030	11,7	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	5.319	10,1	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	12.349	10,9
Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	5.319	8,8	Fiebre de origen desconocido	4.609	8,7	Fiebre de origen desconocido	9.863	8,7
Fiebre de origen desconocido	5.254	8,7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4.514	8,5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	9.833	8,7
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3.132	5,2	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3.007	5,7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	6.139	5,4
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.595	4,3	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.387	4,5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4.982	4,4
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.216	3,7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.256	4,3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4.472	4,0
Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	2.061	3,4	Otras afecciones originadas del periodo perinatal	1.555	2,9	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	3.616	3,2
Asma	1.337	2,2	Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	1.282	2,4	Otras enfermedades virales	2.538	2,2
Otras enfermedades virales	1.293	2,1	Otras enfermedades virales	1.245	2,4	Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	2.487	2,2
Otras causas	22.178	36,8	Otras causas	18.626	35,2	Otras causas	40.936	36,2
<b>Total en menores de 1 año</b>	<b>60.239</b>	<b>100</b>	<b>Total en menores de 1 año</b>	<b>52.865</b>	<b>100</b>	<b>Total en menores de 1 año</b>	<b>113.104</b>	<b>100</b>

En el año 2016 en Medellín, las diez primeras causas de consulta externa en niños menores de 1 año agruparon el 63,2% de las atenciones en hombres y 64,8% en mujeres.

En los menores de 1 año, los primeros motivos de consulta externa están relacionados con afecciones de las vías respiratorias, que agrupados incluyen los diagnósticos de: "Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores", "Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda" y "Asma", estas tres afecciones representan el 26,9% de las atenciones en los niños y en las niñas el 25,3%, a diferencia que en estas no se incluye "Asma" dentro de los primeros motivos.

En segundo lugar se agrupan dos diagnósticos relacionados con "Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer" y "Otras afecciones originadas en el periodo perinatal" que suman el 11,9%, proporción levemente mayor en niños que en niñas (12,3% y 11,5% respectivamente).

Seguidamente y en ambos sexos se encuentra la "Fiebre de origen desconocido", que agrupa el 8,7%.

En más del 5% de las atenciones se reportaron "Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte".

Le siguen en orden descendente la "Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso" (4,4%) y con similar proporción en niños y niñas; "Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo", mayor en niñas (4,3%) que en niños (3,7%) y "Otras enfermedades virales" similar en niñas y niños (2,1% y 2,4% respectivamente).

#### Fuente:

RIPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios; morbilidad por consulta externa. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2016.



## Morbilidad

### Diez primeros diagnósticos en Consulta Externa por sexo y grupos de edad (298 causas CIE10), Medellín, año 2016

Hombres			Mujeres			Total		
Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%
De 1 a 4 años			De 1 a 4 años			De 1 a 4 años		
Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	18.883	12,0	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	17.894	12,6	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	36.777	12,3
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	10.744	6,8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	10.115	7,1	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	20.859	7,0
Fiebre de origen desconocido	9.084	5,8	Fiebre de origen desconocido	9.543	6,7	Fiebre de origen desconocido	18.627	6,2
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8.380	5,3	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7.206	5,1	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	15.586	5,2
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	8.270	5,3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	7.183	5,1	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15.453	5,2
Asma	7.637	4,9	Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides	6.146	4,3	Asma	13.718	4,6
Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides	7.123	4,5	Asma	6.081	4,3	Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides	13.269	4,4
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	6.115	3,9	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	6.029	4,3	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	12.144	4,1
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5.467	3,5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5.512	3,9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10.979	3,7
Otras enfermedades virales	4.416	2,8	Otras enfermedades virales	4.096	2,9	Otras enfermedades virales	8.512	2,8
Otras causas	70.810	45,1	Otras causas	61.981	43,7	Otras causas	132.791	44,5
<b>Total de 1 a 4 años</b>	<b>156.929</b>	<b>100</b>	<b>Total de 1 a 4 años</b>	<b>141.786</b>	<b>100</b>	<b>Total de 1 a 4 años</b>	<b>298.715</b>	<b>100</b>

En el año 2016 en Medellín, las diez primeras causas de consulta externa en niños de 1 a 4 años agruparon el 54,9% de las atenciones en hombres y 56,3% en mujeres.

En los niños de 1 a 4 años, los primeros motivos de consulta externa están relacionados con afecciones de las vías respiratorias, entre los cuales se agrupan los diagnósticos de "Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores", "Faringitis aguda y amigdalitis aguda", "Asma" y "Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides", los cuales sumaron el 26,5% de las consultas, proporción muy similar en niños y niñas de esta edad.

En segundo lugar, con un 7% y con proporciones similares en ambos sexos, se encuentran los diagnósticos relacionados con "Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte".

En tercer lugar se encuentra la fiebre de origen desconocido, mayor en niñas que en niños (6,7% y 5,8% respectivamente).

Seguidamente se encuentra la "Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso" con (5,2%), proporción similar en niños y niñas.

Finalmente en orden descendente se incluyen como primeros motivos de consulta los diagnósticos referentes a "Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten", con proporción levemente mayor en niñas (4,3%) que en niños (3,9%), "Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo", en niñas (3,9%) en niños (3,5%) y "Otras enfermedades virales" (2,8%).

**Fuente:**

RIPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios; morbilidad por consulta externa. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2016.



## Morbilidad

### Diez primeros diagnósticos en Consulta Externa por sexo y grupos de edad (298 causas CIE10), Medellín, año 2016

Hombres			Mujeres			Total		
Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%
De 5 a 14 años			De 5 a 14 años			De 5 a 14 años		
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	26.197	11,4	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25.506	11,8	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	51.703	11,6
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	20.169	8,8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	19.319	8,9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	39.488	8,8
Otros trastornos mentales y del comportamiento	15.024	6,5	Caries dental	12.300	5,7	Caries dental	25.592	5,7
Caries dental	13.292	5,8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9.013	4,2	Otros trastornos mentales y del comportamiento	20.910	4,7
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9.604	4,2	Dolor abdominal y pélvico	8.956	4,1	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	18.161	4,1
Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	9.356	4,1	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	8.805	4,1	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15.977	3,6
Asma	7.139	3,1	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6.638	3,1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15.236	3,4
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6.964	3,0	Trastornos de la acomodación y de la refracción	6.493	3,0	Dolor abdominal y pélvico	15.028	3,4
Otras enfermedades de la nariz y de los senos paranasales	6.323	2,8	Otros trastornos mentales y del comportamiento	5.886	2,7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12.779	2,9
Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6.141	2,7	Otros traumatismos de regiones especificas, de regiones no especificas y de múltiples regiones del cuerpo	5.632	2,6	Asma	12.394	2,8
Otras causas	109.297	47,6	Otras causas	108.207	49,9	Otras causas	218.993	49,1
<b>Total de 5 a 14 años</b>	<b>229.506</b>	<b>100</b>	<b>Total de 5 a 14 años</b>	<b>216.755</b>	<b>100</b>	<b>Total de 5 a 14 años</b>	<b>446.261</b>	<b>100</b>

En el año 2016 en Medellín, las diez primeras causas de consulta externa en menores de edad entre 5 y 14 años agruparon el 52,4% de las atenciones en hombres y 50,1% en mujeres.

En los menores de edad entre 5 y 14 años y al agrupar algunos de los primeros motivos de consulta, se presenta en primer lugar en ambos sexos, los diagnósticos relacionados con salud bucal como son "Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén" y "Caries dental", que sumaron el 17,3%.

En segundo lugar y similar en ambos sexos, se presentan "Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte", que corresponden al 8,8%.

En tercer lugar, con mayor proporción en hombres que en mujeres, se agrupan 4 diagnósticos relacionados con afecciones de las vías respiratorias como "Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores", "Asma", "Faringitis aguda y amigdalitis aguda" y "Otras enfermedades de la nariz y de los senos paranasales", en hombres suma el 12,6%, a diferencia que en las mujeres, de estos cuatro diagnósticos, solo incluye dos como primeros motivos: "Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores" y "Faringitis aguda y amigdalitis aguda" que suman el 7,1% de las atenciones.

En hombres, seguidamente se encuentran "Otros trastornos mentales y del comportamiento" con el 6,5% de las atenciones, "Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo" con el 4,2%, ambos diagnósticos con proporción mayor en hombres que en mujeres de este grupo de edad y finalmente "Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo" con el 3,0%. El resto de causas en los hombres entre 5 y 14 años de edad agruparon el 47,6%.

En las mujeres, además se encuentran dentro de los primeros motivos "Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo" con el 4,2%, "Dolor abdominal y pélvico" con el 4,1%, "Trastornos de la acomodación y de la refracción" con el 3,0%, "Otros trastornos mentales y del comportamiento" con el 2,7% (proporción menor a la de los hombres) y finalmente "Otros traumatismos de regiones especificas, de regiones no especificas y de múltiples regiones del cuerpo" con el 2,6%. El resto de causas en las mujeres entre 5 y 14 años de edad agruparon el 49,9%.

**Fuente:**

RIPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios; morbilidad por consulta externa. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2016.



## Morbilidad

### Diez primeros diagnósticos en Consulta Externa por sexo y grupos de edad (298 causas CIE10), Medellín, año 2016

Hombres			Mujeres			Total		
Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%
De 15 a 44 años			De 15 a 44 años			De 15 a 44 años		
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	62.237	7,4	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	113.415	8,1	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	170.711	7,7
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	59.134	7,1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	81.742	5,9	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	140.876	6,3
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	57.296	6,8	Dolor abdominal y pélvico	61.011	4,4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	93.871	4,2
Otras dorsopatías	36.953	4,4	Migraña y otros síndromes de cefalea	49.844	3,6	Otras dorsopatías	84.482	3,8
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	31.663	3,8	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	49.790	3,6	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	77.849	3,5
Caries dental	29.709	3,5	Otras dorsopatías	47.529	3,4	Dolor abdominal y pélvico	76.399	3,4
Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28.527	3,4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	44.098	3,2	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	72.625	3,3
Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	28.059	3,3	Caries dental	40.404	2,9	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	70.225	3,1
Trastornos de los tejidos blandos	27.071	3,2	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	38.562	2,8	Caries dental	70.113	3,1
Fractura de otros huesos de los miembros	20.764	2,5	Trastornos de los tejidos blandos	37.812	2,7	Trastornos de los tejidos blandos	64.883	2,9
Otras causas	457.358	54,5	Otras causas	828.064	59,5	Otras causas	1.309.008	58,7
<b>Total de 15 a 44 años</b>	<b>838.771</b>	<b>100</b>	<b>Total de 15 a 44 años</b>	<b>1.392.271</b>	<b>100</b>	<b>Total de 15 a 44 años</b>	<b>2.231.042</b>	<b>100</b>

En el año 2016 en Medellín, las diez primeras causas de consulta externa en personas entre 15 y 44 años agruparon el 45,5% de las atenciones en hombres y 40,5% en mujeres.

En las personas con edades entre 15 y 44 años y en ambos sexos se agrupan en el primer lugar de consulta externa los diagnósticos relacionados con salud bucal: "Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén" y "Caries dental" (que suman el 10,6% en hombres y 8,8% en mujeres).

En términos generales, los primeros motivos de consulta son muy diferentes según el sexo. En los hombres, en segundo lugar se agrupan los diagnósticos: "Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo" y "Fracturas de los huesos de los miembros" con el 9,9%, mientras que las mujeres presentan en segundo lugar "Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte" con el 8,1%, el cual es del 6,8% en los hombres.

Los hombres presentan una proporción levemente mayor que las mujeres en diagnósticos como "Otras dorsopatías" (4,4% y 3,4% respectivamente) y "Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso" (3,8% y 2,8% respectivamente).

En las mujeres, adicionalmente se encuentran otros primeros motivos de consulta como el "Dolor abdominal y pélvico" (4,4%) y la "Migraña y otros síndromes de cefalea" (3,6%).

En menor y similar proporción en hombres y mujeres se presentan otros motivos de consulta como: "Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo" (3,4% y 3,2% respectivamente), "Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores" (3,3% vs 3,6%) y "Trastornos de los tejidos blandos" (3,2% y 2,7% respectivamente).

En este grupo de edad, el resto de causas de consulta externa agruparon el 54,5% de las atenciones en hombres y el 59,5% en mujeres.

#### Fuente:

RIPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios; morbilidad por consulta externa. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2016.



**Morbilidad**

Fecha elaboración: Abril-Mayo de 2018

**Diez primeros diagnósticos en Consulta Externa por sexo y grupos de edad (298 causas CIE10), Medellín, año 2016**

Hombres			Mujeres			Total		
Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%
De 45 a 64 años			De 45 a 64 años			De 45 a 64 años		
Hipertensión esencial	56.510	12,4	Hipertensión esencial	117.401	13,3	Hipertensión esencial	173.911	13,0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	28.226	6,2	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	59.145	6,7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	87.371	6,5
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25.948	5,7	Trastornos de los tejidos blandos	40.137	4,5	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	65.589	4,9
Diabetes mellitus	24.036	5,3	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	39.641	4,5	Diabetes mellitus	60.836	4,5
Otras dorsopatías	19.158	4,2	Diabetes mellitus	36.800	4,2	Trastornos de los tejidos blandos	58.885	4,4
Trastornos de los tejidos blandos	18.748	4,1	Otras dorsopatías	34.692	3,9	Otras dorsopatías	53.850	4,0
Caries dental	14.426	3,2	Caries dental	22.978	2,6	Caries dental	37.404	2,8
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14.023	3,1	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	22.370	2,5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	35.658	2,7
Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	13.288	2,9	Otros trastornos de la tiroides	22.141	2,5	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	27.056	2,0
Trastornos de la acomodación y de la refracción	9.057	2,0	Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores	19.317	2,2	Otros trastornos de las articulaciones	26.425	2,0
Otras causas	231.788	50,9	Otras causas	470.124	53,1	Otras causas	712.969	53,2
<b>Total 45 a 64 años</b>	<b>455.208</b>	<b>100</b>	<b>Total de 45 a 64 años</b>	<b>884.746</b>	<b>100</b>	<b>Total de 45 a 64 años</b>	<b>1.339.954</b>	<b>100</b>

En el año 2016 en Medellín, las diez primeras causas de consulta externa en personas entre 45 y 64 años agruparon el 49,1% de las atenciones en hombres y 46,9% en mujeres. En las personas con edades entre 45 y 64 años y en ambos sexos se agrupan como primer motivo de consulta externa la "Hipertensión esencial" (12,4% en hombres y 13,3% en mujeres), seguido por los diagnósticos que agrupados se relacionan con salud bucal "Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén" y "Caries dental" (que agrupan el 8,9% en hombres y 7,1% en mujeres). En tercer lugar se encuentran "Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte" con 6,2% y 6,7% respectivamente. La Diabetes mellitus presenta una proporción levemente mayor en hombres que en mujeres (5,3% y 4,2% respectivamente), similar a los "Trastornos de los tejidos blandos" (4,1% y 4,5% respectivamente), "Otras dorsopatías" (4,2% y 3,9% respectivamente), "Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos" (2,9% y 2,5% respectivamente). Adicionalmente y en menor proporción, en los hombres se presentan como primeros motivos de consulta "Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo" con el 3,1% y "Trastornos de la acomodación y de la refracción" con el 2,0%; mientras que en las mujeres se presentan diagnósticos como "Otros trastornos de la tiroides" con el 2,5% y "Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores" con el 2,2%. En este grupo de edad, el resto de causas de consulta externa gruparon el 50,9% de las atenciones en hombres y 53,1% en mujeres.



**Morbilidad**

**Diez primeros diagnósticos en Consulta Externa por sexo y grupos de edad (298 causas CIE10), Medellín, año 2016**

Hombres			Mujeres			Total		
Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%	Diagnóstico	Casos	%
De 65 años y más			De 65 años y más			De 65 años y más		
Hipertensión esencial	129.398	21,3	Hipertensión esencial	247.959	22,1	Hipertensión esencial	377.357	21,8
Diabetes mellitus	46.707	7,7	Diabetes mellitus	82.312	7,3	Diabetes mellitus	129.019	7,5
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	37.877	6,2	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	70.312	6,3	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	108.189	6,3
Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	22.530	3,7	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	33.139	3,0	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	55.669	3,2
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	15.889	2,6	Otras dorsopatías	30.890	2,8	Otras dorsopatías	44.933	2,6
Hiperplasia de la próstata	14.934	2,5	Trastornos de los tejidos blandos	29.729	2,6	Trastornos de los tejidos blandos	42.011	2,4
Otras dorsopatías	14.043	2,3	Artrosis	26.264	2,3	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	37.194	2,2
Trastornos de los tejidos blandos	12.282	2,0	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	26.094	2,3	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	36.283	2,1
Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	11.100	1,8	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sosten	20.394	1,8	Artrosis	33.153	1,9
Insuficiencia renal	10.480	1,7	Otras enfermedades del sistema urinario	20.101	1,8	Otras enfermedades del sistema urinario	30.214	1,7
Otras causas	291.107	48,0	Otras causas	534.704	47,7	Otras causas	834.223	48,3
<b>Total 65 y más años</b>	<b>606.347</b>	<b>100</b>	<b>Total de 65 años y más</b>	<b>1.121.898</b>	<b>100</b>	<b>Total de 65 años y más</b>	<b>1.728.245</b>	<b>100</b>

En el año 2016 en Medellín, las diez primeras causas de consulta externa en personas de 65 años y más agruparon alrededor del 52% de las atenciones en hombres y mujeres.

En el grupo de personas de 65 años y más, ambos sexos presentan una alta proporción de "Hipertensión esencial", que se ubica como el primer motivo de consulta externa (21,8% a nivel general, similar entre hombres y mujeres, con 21,3% y 22,1% respectivamente).

En segundo lugar y levemente mayor en hombres que en mujeres, se encuentra la Diabetes mellitus (7,5%), seguido por "Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte" con 6,3%. Le siguen en su orden la "Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas", que fue levemente mayor en hombres (3,7%) que en mujeres (3,0%).

Otros diagnósticos que presentan una proporción menor pero similar en ambos sexos son: "Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén" (2,6% y 1,8% respectivamente), "Otras dorsopatías" (2,3% y 2,8% respectivamente), "Trastornos de los tejidos blandos" (2,0% y 2,6% respectivamente), "Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos" (1,8% y 2,3% respectivamente).

Adicionalmente en los hombres se presenta la "Hiperplasia de próstata" (2,5%) y la "Insuficiencia renal" (1,7%), mientras que en las mujeres se presenta "Artrosis" (2,3%) y "Otras enfermedades del sistema urinario" (1,7%).

En este grupo de edad, el resto de causas de consulta externa agruparon alrededor del 48% en hombres y mujeres.

**Fuente:**

RIPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios; morbilidad por consulta externa. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2016.